

FAZOR STAR

FITOREGOLATORE IN GRANULI SOLUBILI PER IL CONTROLLO DEI GERMOGLI DI CIPOLLA, AGLIO E PATATA

Composizione

Idrazide maleica pura

(contenente meno di 0,028 mg/Kg di idrazina)

Coformulanti

g 60
q.b.a g 100



INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. Ministero della Salute n. 11258 del 04/04/2002

Titolare della registrazione: UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.

Claudius Prinsenlaan 144 A, 4818 CP, Breda, NOORD-BRABANT, The Netherlands Tel. +31 (0) 850712300

Stabilimenti di produzione: EXWOLD TECHNOLOGY Ltd. - Billingham, Stockton-on-Tees TS23 1PZ, UK; Arysta Lifescience Ougrée Production sprl - Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée (Belgio); Arysta LifeScience S.A.S. - BP 80, Route D'Artix, F-64150 Noguères (Francia); Arysta LifeScience India Limited (EOU-Unit-II) - Survey No. 229 & 230, Kalol Notified Area, Kalol (Panchmahal), Gujarat (India)

Stabilimento di rietchettatura: ARCO Logistica Srl - Via A. Battistella 22, 44123 Ferrara

Distribuito da: UPL ITALIA SRL - Via Terni 275, S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547 661523; CERTIS BELCHIM B.V. Via Varese 25/D, scala A, 21047 Saronno (VA) Tel. 02 9609983

Partita n.

Contenuto: 0,5 - 1 - 5 - 15 Kg

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose, tremori, convulsioni fino al coma. **Terapia:** sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

Caratteristiche

Il FAZOR STAR viene assorbito dalle piante per via fogliare e traslocato in ogni suo organo per via linfatica. Nei germogli, inibisce principalmente i processi respiratori delle cellule, riduce le attività enzimatiche, rallenta la moltiplicazione cellulare. La sommatoria di queste complesse azioni impedisce lo sviluppo dei germogli. Nella cipolla, nell'aglio e nella patata il FAZOR STAR inibisce la germinazione durante la conservazione in magazzino e ne evita inoltre le perdite dovute alla disidratazione.

CIPOLLE ED AGLIO

Dosi e modalità d'impiego

Cipolla: 4 Kg in 400-600 litri di acqua per ettaro.

Aglio: 4 Kg in 400-600 litri di acqua per ettaro.

Assicurare una buona copertura delle foglie.

Il rispetto dei tempi di applicazione è essenziale per ottenere i migliori risultati.

Nelle cipolle: applicare FAZOR STAR quando si verifica lo stadio di inizio piegamento delle foglie. Il momento ottimale si individua quando il 10-30% delle foglie sono piegate, ma sono ancora tutte verdi. Questo stadio si raggiunge da circa 2 settimane a 10 giorni prima della raccolta.

Nell'aglio: FAZOR STAR si applica allo stadio che precede l'appassimento, quando tutte le foglie sono ancora verdi, appena prima il viraggio al colore giallo che si verifica da 2 settimane a 10 giorni prima della raccolta.

Per le cipolle e l'aglio la presenza di foglie verdi è essenziale per consentire l'assorbimento del FAZOR STAR e la sua traslocazione. FAZOR STAR non ha effetto se la sua applicazione è troppo tardiva.

Su aglio e cipolla evitare di applicare il prodotto troppo anticipatamente. Se l'applicazione è effettuata prima di due settimane dalla maturazione potrebbero svilupparsi dei bulbi spugnosi.

PATATA

Dosi e modalità d'impiego

Patata: 5 Kg in 400-600 litri d'acqua per ettaro.

Assicurare una buona copertura delle foglie.

Il rispetto dei tempi di applicazione è essenziale per ottenere i migliori risultati. **Nella patata** FAZOR STAR controlla la formazione dei germo-

gli, migliora la qualità dei tuberi durante la conservazione ed inoltre riduce la rinascita delle patate in campo. Su patata, per favorire l'assorbimento e la traslocazione del prodotto nei tuberi, FAZOR STAR deve essere applicato preferibilmente nelle ore più fresche del giorno, possibilmente al mattino.

Il momento ottimale per l'applicare del FAZOR STAR è quando la lunghezza media dei tuberi secondari più piccoli destinati alla raccolta è di almeno 25 millimetri.

Gli interventi possono essere effettuati anche in epoche successive ma in questi casi si potrebbe verificare una riduzione dell'efficacia. Le applicazioni in tempi precedenti al momento ottimale devono essere evitate in quanto si potrebbero avere effetti negativi sulle dimensioni e sul peso dei tuberi e fenomeni transitori di ingiallimento del fogliame.

Avvertenze agronomiche:

Su tutte le colture di cipolla, aglio e patata, per consentire il migliore assorbimento e traslocazione del FAZOR STAR, non trattare in condizioni di carenza idrica, quando la temperatura supera i 26°C o quando la coltura è sotto condizioni di stress da malattie fungine o da attacchi di insetti. Sebbene il FAZOR STAR non sia volatile bisogna assolutamente evitare la deriva del prodotto sulle colture vicine.

Apparirà una diminuzione di efficacia se piove o se si irriteranno le colture entro 24 ore dal trattamento.

FAZOR STAR non deve essere applicato su colture destinate alla riproduzione.

Compatibilità: Il FAZOR STAR non è compatibile con gli antiparassitari e con i fertilizzanti fogliari. Pertanto, va irrorato da solo.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Su CIPOLLA ed AGLIO sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta, su PATATA 21 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O
CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**