

ARELI®

Fungicida per il controllo della peronospora della patata
Sospensione concentrata
MECCANISMO D'AZIONE 40 (valifenalate), 21 (cyazofamide) (FRAC)

ARELI®

Composizione:

Valifenalate	g 14,16 (150 g/L)
Cyazofamid	g 7,7 (80 g/L)
Coformulanti q.b. a	g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea;
H351 Sospettato di provocare il cancro;
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze; P261 Evitare di respirare gli aerosol;
P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro; P280 Indossare guanti protettivi/proteggere il viso; P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico;
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito; P405 Conservare sotto chiave; P501 Smaltire il contenuto/recipiente in accordo alla normativa vigente.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare dell'Autorizzazione:

CERTIS BELCHIM B.V.
Sede legale: Stadsplateau 16, Utrecht (Paesi Bassi)
Sede secondaria: Via Varese 25/D – 21047 Saronno Tel. 02 9609983

Officine di Produzione:

Phyteurop S.A. Rue Pierre My, ZI Grande Champagne, 49260 Montreuil-Bellay (Francia)
S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA Via Matteotti 16, 48121 Ravenna (Italia)

Stabilimento di rietichettatura:

Arco logistica Srl -Via Antonio Battistella, 22 - 44123 Ferrara (FE)

Registrazione n. 18511 del Ministero della Salute del 16.07.2024

Contenuto netto: Litri 0,5-1-5-10-15

Partita n.: vedere sulla confezione

© Marchio registrato CERTIS BELCHIM B.V.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di rispetto non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali. Rispettare una fascia di rispetto di almeno 3 m durante il trattamento dall'area frequentata dalle persone e dalle zone suscettibili di frequentazione dei residenti.

Non rientrare nell'area trattata prima di 48 h dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Consultare un Centro Antiveneni

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

ARELI® è una miscela di due principi attivi:

- Valifenalate, una volta assorbito ha la capacità di essere traslocato all'interno della pianta proteggendo la vegetazione di nuova formazione.
- Cyazofamid, agisce per contatto riducendo il rilascio delle zoospore e lo sviluppo del fungo.

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE L/ha	VOLUME D'ACQUA L/ha	N. APPLICAZIONI
Patata	Peronospora della patata (<i>Phytophthora infestans</i>)	1	150-600	4 (intervallo tra le applicazioni: 5-7 giorni)

Applicare ARELI preventivamente alla comparsa dell'avversità. Iniziare il ciclo dei trattamenti quando si verificano le condizioni predisponenti alla malattia. Ripetere il trattamento ogni 5-7 giorni in funzione dell'accrescimento vegetativo della coltura e delle condizioni metereologiche, per un massimo di 4 trattamenti l'anno.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Evitare la fuoriuscita in ambiente.

PREVENZIONE DELLA RESISTENZA

Per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza applicare preventivamente al dosaggio raccomandato per un massimo di due applicazioni consecutive. Si consiglia l'impiego alternato con fungicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione. Seguire le buone pratiche agronomiche.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Agitare la confezione prima dell'uso.

Riempire il serbatoio dell'irroratrice fino a metà del volume totale con acqua pulita. Mettere in funzione l'agitatore, aggiungere ARELI® alla dose indicata e portare a volume. Sciacquare tre volte il contenitore e aggiungere il prodotto diluito nel serbatoio. Applicare mantenendo l'agitatore in azione.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.