

ERADICOAT® MAX

Acaricida-insetticida per orticole, agrumi, pero, drupacee *, vite, fragola, piccoli frutti *, mandorlo, noce, nocciolo, pistacchio, kiwi *, banana, mango, ananas, papaya, avocado, floreali ed ornamentali
Concentrato solubile

ERADICOAT® MAX

Composizione:

Maltodestrina g 40
Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea; H318 Provoca gravi lesioni oculari.



PERICOLO

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P261 Evitare di respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere il viso; P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; P310 contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI; P362+ P364 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente; P501 Smaltire il contenuto/recipiente in accordo alla normativa vigente.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare dell'Autorizzazione:

CERTIS BELCHIM B.V.

Sede legale: Stadsplateau 16, Utrecht (Paesi Bassi)

Sede secondaria: Via Varese 25/D – 21047 Saronno Tel. 02 9609983

Officine di Produzione:

K&N EFTHYMIADIS SINGLE MEMBER S.A., Industrial Area of Thessaloniki, P.O. Box 48, 570 22 Sindos, Thessaloniki, Greece

Stabilimento di rietichettatura:

Arco logistica S.r.l. -Via Antonio Battistella, 22 - 44123 Ferrara (FE)

Registrazione n. 18153 del Ministero della Salute del 14/11/22

Contenuto netto: Litri 0,1-0,5-1-5-10-20-25-50

Partita n.: vedere sulla confezione

® Marchio registrato da CERTIS BELCHIM B.V.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Indossare guanti, indumenti di protezione ed un'adeguata protezione per il viso durante la manipolazione del formulato.

Pericoloso per le api. Non applicare mentre le api sono in piena attività. Non applicare in presenza di infestanti in fiore. Per proteggere gli artropodi e gli insetti non bersaglio: impiegare la migliore tecnica di applicazione disponibile per minimizzare la deriva; rispettare una fascia di rispetto di 5 m del confine del campo.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

Consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

ERADICOAT® MAX è un acaricida-insetticida ad ampio spettro per il controllo di acari, eriofidi, afidi, psilla, cocciniglie ed aleurodidi. Nello specifico ERADICOAT® MAX agisce per azione fisica di contatto, bloccando l'insetto e portandolo alla morte in seguito all'ostruzione degli spiracoli tracheali. L'attività del prodotto può essere osservata già dopo 2-4 ore dall'applicazione.

COLTURA	FITOFAGI	DOSE L/hi	DOSE MASSIMA L/ha	VOLUME D'ACQUA L/ha	N. APPLICAZIONI
Agrumi	Acari (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus citri</i> , etc.), Cocciniglie (<i>Planococcus spp.</i> , <i>Icerya purchasi</i> , <i>Delottococcus aberia</i>)	1-1.5	45	1000-3000	5 (intervallo tra le applicazioni: 5-10 giorni)
Pero	Psilla del pero (<i>Cacopsylla pyri</i>)	1.5-2	30	1000-1500	5 (intervallo tra le applicazioni: 5-10 giorni)
Drupacee (pesco, nettarino, susino, ciliegio, albicocco) *	Acari, Cocciniglie	1.5-2	30	500-1500	5 (intervallo tra le applicazioni: 5-7 giorni)
Vite da tavola	Cocciniglie (<i>Planococcus ficus</i>)	1-1.5	22.5	500-1500	5 (intervallo tra le applicazioni: 5-10 giorni)
Vite da vino	Acari eriofidi	1-1.5	22.5	500-1500	5 (intervallo tra le applicazioni: 5-10 giorni)
Pomodoro, peperone e melanzana (pieno campo)	Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Acari (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5-2	30	200-1500	5 (intervallo tra le applicazioni: 3-7 giorni)
Zucchini e cetriolo (pieno campo)	Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1.5-2	30	200-1500	5 (intervallo tra le applicazioni: 3-7 giorni)
Melone, anguria e zucca (pieno campo)	Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Acari (<i>Tetranychus urticae</i>), Afidi	1.5-2	30	200-1500	5 (intervallo tra le applicazioni: 3-7 giorni)
Lattughe e insalate, foglie di spinaci e simili, erbe fresche (pieno campo)	Afidi	1.5-2	30	200-1500	5 (intervallo tra le applicazioni: 3-7 giorni)
Fragola (pieno campo)	Acari (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5-2	30	200-1500	5 (intervallo tra le applicazioni: 3-7 giorni)
Piccoli frutti *	Acari, Cocciniglie	1.5-2	30	500-1500	5 (intervallo tra le applicazioni: 3-7 giorni)
Mandorlo, noce, nocciolo e pistacchio	Cocciniglie	1-1.5	45	1000-3000	5 (intervallo tra le applicazioni: 5-10 giorni)
Kiwi *	Acari, Cocciniglie	1.5-2	30	500-1500	5 (intervallo tra le applicazioni: 5-7 giorni)
Banana, mango, ananas, papaya, avocado	Cocciniglie	1-1.5	45	1000-3000	5 (intervallo tra le applicazioni: 5-10 giorni)
Orticole (con buccia edibile e non edibile) floreali ed ornamentali (serra)	Acari (forme adulte e giovanili), Afidi (forme adulte e giovanili), Aleurodidi (forme adulte, larve e uova)	2	60	200-3000	20 (intervallo tra le applicazioni: 7 giorni)

Per una corretta distribuzione del prodotto utilizzare volumi di acqua tali da assicurare una completa ed uniforme bagnatura della coltura da trattare, avendo cura di bagnare anche la pagina inferiore delle foglie e prestando particolare attenzione alla presenza di focolai di infestazione.

Per avere la massima efficacia del prodotto si consiglia di trattare su vegetazione asciutta, nelle ore più calde e in giornate soleggiate. Una rapida asciugatura del prodotto consente una veloce immobilizzazione dell'insetto.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Evitare la fuoriuscita in ambiente.

FITOTOSSICITÀ

Considerata l'ampia disponibilità di colture si consiglia di effettuare saggi preliminari prima dell'applicazione al fine di evitare fenomeni di fitotossicità. Nel caso delle piante floreali ed ornamentali, non applicare in presenza di fiori o infiorescenze.

PREVENZIONE DELLA RESISTENZA

ERADICOAT® MAX non ha evidenziato fenomeni di resistenza nei confronti degli insetti proposti in etichetta. Si consiglia di applicarlo in modo alternato con altri formulati a diverso meccanismo di azione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Agitare la confezione prima dell'uso.

Riempire il serbatoio dell'irroratrice fino a metà del volume totale con acqua pulita, quindi aggiungere ERADICOAT® MAX alla dose stabilita. Mettere in funzione l'agitatore e portare a volume. Evitare di agitare troppo per limitare la formazione di schiuma. Applicare immediatamente dopo la preparazione della miscela.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

(*) VALIDITÀ REGISTRAZIONE: dal 7 giugno 2024 al 4 ottobre 2024 con un utilizzo limitato alla seguente coltura:

- **Drupacee**
- **Piccoli frutti**
- **Kiwi**

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

ERADICOAT® MAX

Acaricida-insetticida per orticole, agrumi, pero, drupacee *, vite, fragola, piccoli frutti *, mandorlo, noce, nocciolo, pistacchio, kiwi *, banana, mango, ananas, papaya, avocado, floreali ed ornamentali
Concentrato solubile

ERADICOAT® MAX

Composizione:

Maltodestrina g 40
Coformulanti q.b. a g 100



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea; H318 Provoca gravi lesioni oculari.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P261 Evitare di respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/proteggere il viso; P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; P310 contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI; P362+ P364 Togliere di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente; P501 Smaltire il contenuto/recipiente in accordo alla normativa vigente.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare dell'Autorizzazione:

CERTIS BELCHIM B.V.

Sede legale: Stadsplateau 16, Utrecht (Paesi Bassi)

Sede secondaria: Via Varese 25/D – 21047 Saronno Tel. 02 9609983

Officine di Produzione:

K&N EFTHYMIADIS SINGLE MEMBER S.A., Industrial Area of Thessaloniki, P.O. Box 48, 570 22 Sindos, Thessaloniki, Greece

Stabilimento di rietichettatura:

Arco logistica S.r.l. -Via Antonio Battistella, 22 - 44123 Ferrara (FE)

Registrazione n. 18153 del Ministero della Salute del 14/11/22

Contenuto netto: Litri 0,1-0,5-1-5-10-20-25-50

Partita n.: vedere sulla confezione

® Marchio registrato CERTIS BELCHIM B.V.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Indossare guanti, indumenti di protezione ed un'adeguata protezione per il viso durante la manipolazione del formulato. Pericoloso per le api. Non applicare mentre le api sono in piena attività. Non applicare in presenza di infestanti in fiore. Per proteggere gli artropodi e gli insetti non bersaglio: impiegare la migliore tecnica di applicazione disponibile per minimizzare la deriva; rispettare una fascia di rispetto di 5 m del confine del campo. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Consultare un Centro Antiveleni

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.**

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

(*) VALIDITÀ REGISTRAZIONE: dal 7 giugno 2024 al 4 ottobre 2024 con un utilizzo limitato alla seguente coltura:

- **Drupacee**
- **Piccoli frutti**
- **Kiwi**