

NEMACLEAN

Nematocida per pomodoro, melanzana, peperone, zucchini, cetriolo, melone, zucca e anguria
Polvere bagnabile

NEMACLEAN

Composizione

Purpureocillium lilacinum g. 2 (= 2 x 10⁹ CFU/g)

ceppo PL-11

Coformulanti q.b. a g.100

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti.

EUH 208 contiene *purpureocillium lilacinum*. Può provocare una reazione allergica.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare della registrazione

MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V.

Avenue de Tervueren 270 - 1150 Brussels - Belgio

Tel:+32 (0) 2 773 16 80

Distributore:

CERTIS BELCHIM B.V.

Via Varese 25/D - 21047 Saronno (VA)

Tel.: +39 029609983

Stabilimento di produzione e/o confezionamento:

Certis U.S.A. L.L.C., 117 South Parkmont, St., Butte, Montana (U.S.A.)

Stabilimento di rietichettatura

ARCO LOGISTICA S.r.l

- Via Antonio Battistella 22, Ferrara (FE)

- Via Gherardo Monari 5, Ferrara (FE)

Registrazione Ministero della Salute n. 19018 del 14/10/2025

Contenuto netto: Kg 0.25, 0.5, 1, 2, 5

Partita n.: vedere imballo

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'AZIONE

Il fungo *Purpureocillium lilacinum* (ceppo PL-11) agisce come parassita dei nematodi che formano galle radicali (*Meloidogyne* spp.). NEMACLEAN è particolarmente efficace sulle uova, ma controlla anche gli stadi giovanili e le femmine adulte.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COLTURA	n. APPLICAZIONI	DOSE
Pomodoro, peperone e melanzana	4-10 (15-20 giorni intervallo)	0,5 Kg/ha (prime 2 applicazioni) 0,25 Kg/ha (dalla terza applicazione)
Zucchini, cetriolo, cetriolino		
Melone, zucca, anguria		

NEMACLEAN si applica tramite manichetta forata per irrigazione a goccia, per il controllo di *Meloidogyne* spp. in serra e tunnel. NEMACLEAN deve essere localizzato vicino all'apparato radicale su terreno umido.

Effettuare la prima applicazione al trapianto alla dose di 0,5 Kg/ha. Il trattamento deve essere ripetuto ad un intervallo di 15-20 giorni sempre alla dose di 0,5 Kg/ha.

Le applicazioni successive e fino ad un massimo di 10, devono essere effettuate ad un dosaggio di 0,25 Kg/ha.

Effettuare un minimo di 4 trattamenti.

Non applicare fungicidi al suolo per almeno 10 giorni dopo l'applicazione di NEMACLEAN.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

COMPATIBILITÀ: In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

FITOTOSSICITÀ: Considerata l'ampia disponibilità di colture si consiglia di effettuare saggi preliminari prima dell'applicazione al fine di evitare fenomeni di fitotossicità.

PREVENZIONE DELLA RESISTENZA: NEMACLEAN non ha evidenziato fenomeni di resistenza. Si consiglia comunque l'impiego alternato con prodotti aventi diverso meccanismo d'azione.

CONSERVAZIONE: Il prodotto deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta o da fonti di calore eccessive. Le temperature di conservazione ottimali sono comprese tra 4°C e 25°C. La confezione va richiusa dopo l'uso.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA:

Si raccomanda di applicare il prodotto con un volume complessivo di acqua pari a 15.000-20.000 l/ha, avendo cura di distribuire dapprima il 50 % del volume con sola acqua, successivamente applicare la dose opportuna di prodotto diluita con ulteriore 30% di volume e concludere l'applicazione risciacquando l'impianto con il restante 20%. Aumentare il volume di acqua fino a 30.000 l/ha nella fase più avanzata di sviluppo dell'apparato radicale e in presenza di terreni sabbiosi.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.