




# Jura<sup>EC</sup>

Campo libero dalle infestanti per i tuoi cereali



[certisbelchim.it](http://certisbelchim.it)




**Certis Belchim**  
GROWING TOGETHER

USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SUI SIMBOLI. SI RICHIAMA L'ATTENZIONE SULLE FRASI E SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATI IN ETICHETTA.

- La soluzione vincente per la gestione di tutte le infestanti nei cereali a paglia
- Ampio spettro d'azione: monocotiledoni e dicotiledoni
- Indispensabile su loietti e papaveri resistenti



Poa



Loietto




Alopecuro




Papavero



Falaride



Galium



Veronica

**Jura EC®** è un erbicida di pre-emergenza o post-emergenza precoce autorizzato su frumento tenero e duro, orzo, segale e triticale.

**Jura EC®** è una miscela pronta a base di prosulfocarb e diflufenican. Le due sostanze attive presentano un'azione sinergica e complementare tra loro, agendo sia per assorbimento radicale che meristemato. Due meccanismi d'azione differenti (HRAC N e HRAC F1) per il controllo di graminacee e dicotiledoni resistenti agli ALS e ACCase (FOP).

## Il diserbo preventivo nei cereali a paglia: una pratica colturale da riscoprire e valorizzare

Contrasta i fenomeni di competizione determinata dall'indesiderata presenza delle infestanti sin dalle prime fasi della coltura.

Controlla le infestanti diventate tolleranti agli erbicidi di post-emergenza.

E' un'ottima soluzione per quei terreni che in primavera presentano una difficile accessibilità.

## Quando applicare Jura EC®

Le migliori performance si ottengono applicando **Jura EC®** in pre-emergenza o post-emergenza precoce dalla 1° foglia alla 3° foglia vera della coltura con infestati ancora non emerse oppure allo stadio di giovane piantina.

## Dose d'impiego

**Jura EC®** si applica alla dose di 4 L/ha. L'erbicida è ben tollerato dalle colture autorizzate in etichetta e non esistono problemi di selettività su nessuna cultivar. Leggeri sintomi di fitotossicità possono comparire su semi scoperti oppure in situazioni di ristagni di pioggia, ma non compromettono il buon esito del raccolto. **Jura EC®** non pregiudica la possibilità di una coltura intercalare dopo il cereale.

## Raccomandazioni d'impiego

- **Jura EC®** si applica su terreno ben preparato e livellato con il seme ben coperto, circa 3 centimetri di terra.
- Non trattare su terreno asfittico o su coltura sofferente.
- Non trattare in caso di previsione di eventi piovosi persistenti dopo l'applicazione.
- Non trattare in caso di rischio di forti gelate o escursioni termiche accentuate.
- Lievi ingiallimenti possono comparire sulle foglie senza che ci siano conseguenze sulla resa finale.

## Profilo Prodotto

**Composizione:** Prosulfocarb 667 g/L + Diflufenican 14 g/L

**Reg. Ministero della Salute:** N. 17128 del 30/10/2018

**Meccanismo d'azione:** HRAC N e F1

**Formulazione:** Concentrato emulsionabile (EC)

**CLP:** Pericolo

**Dose d'impiego:** Frumento tenero e duro, orzo, segale, triticale 4 L/ha



USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SUI SIMBOLI. SI RICHAMA L'ATTENZIONE SULLE FRASI E SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATI IN ETICHETTA.