


Kusabi®

ANTIOIDICO DI NUOVA GENERAZIONE



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SUI SIMBOLI. SI RICHIAMA L'ATTENZIONE SULLE FRASI E SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATI IN ETICHETTA.

KUSABI®: FUNGICIDA ANTIOIDICO INNOVATIVO PER UNA VALIDA GESTIONE DELLE RESISTENZE SU VITE DA VINO E DA TAVOLA


Composizione

Principio attivo: **PYRIOFENONE**

Famiglia chimica: **BENZOYLPYRIDINE**

MECCANISMO D'AZIONE

KUSABI® inibisce la formazione degli appressori e conseguentemente la penetrazione delle ife nelle cellule della pianta.




Durante il trattamento possono essere presenti più stadi del fungo

Kusabi

svolge azione preventiva/curativa

POSIZIONAMENTO TECNICO



← **Kusabi** →

Effettuare massimo 3 trattamenti/anno con intervallo consigliato di 10 - 14 giorni a seconda delle condizioni per lo sviluppo della malattia

È fortemente raccomandato applicare il prodotto prima della manifestazione dei sintomi della malattia.




**AZIONE
DI VAPORE**

Meccanismo d'azione FRAC 50: alterazione dell'ifa

AZIONE DI VAPORE: PROVE DI LABORATORIO

Trattamento del disco fogliare centrale con **KUSABI®** e successivo inoculo di Oidio dopo 24h su tutte foglie presenti nella piastra.



Disco fogliare non trattato

Disco fogliare trattato con **KUSABI®**

Azione di vapore dimostrata sul bordo delle foglie non trattate.

KUSABI®, grazie alla sua azione di vapore, protegge anche le porzioni di pianta non direttamente irrorate dal trattamento.

PERCHÉ SCEGLIERE KUSABI®

- Non influenza la qualità del vino
- Nessun effetto sulla fermentazione del succo d'uva
- Inserito nei Disciplinari di Difesa Integrata
- Grande efficacia sull'oidio in strategia preventiva
- Non ha effetti negativi sugli acari predatori (*Typhlodromus pyri*)
- Raccomandato nelle strategie di produzione integrata che prevedono anche l'uso alternato in sequenza di altri prodotti con diverso meccanismo d'azione efficaci nel controllo dell'oidio

KUSABI®

Composizione	Pyriofenone 300 g/L
Formulazione	Sospensione Concentrata (SC)
Classificazione CLP	
Reg. Ministero della Salute	15267 del 30/06/2014
Dose	0,3 L/ha
Coltura	Vite da vino - Vite da Tavola
Epoca di applicazione	Inizio Fioritura - Allegagione
Tempo di carenza	28 gg
Confezione	1 L

CERTIS BELCHIM B.V. – ITALIA

Via Varese, 25D scala A
21047 Saronno (VA) - Italia
+39 02 96 099 83
info.it@certisbelchim.com
www.certisbelchim.it



Certis Belchim
GROWING TOGETHER