


 **Leavly+**<sup>®</sup>

BIOSTIMOLANTE A BASE DI *SACCHAROMYCES CEREVISIAE*



**L'INTEGRATORE  
DI VITALITÀ CHE  
DÀ VIGORE  
ALLA PIANTA**



**Certis Belchim**  
GROWING TOGETHER

LEGGERE ATTENTAMENTE L'ETICHETTA PRIMA DELL'APPLICAZIONE RISPETTANDO TUTTE LE AVVERTENZE, LE INDICAZIONI E I CONSIGLI D'USO




## COSA È LEAVLY+®?

**LEAVLY+®** è un biostimolante a base di autolisato di cellule di lievito *Saccharomyces cerevisiae* e suoi metaboliti e borlanda alimentare. **LEAVLY+®**, applicato a partire dal trapianto, stimola il metabolismo della pianta e promuove il suo sviluppo.

## MECCANISMO D'AZIONE:

**LEAVLY+®** è un attivatore di diverse vie metaboliche che stimolano lo sviluppo fisiologico delle piante. L'impiego di **LEAVLY+®**, mediante applicazione fogliare o per via radicale tramite impianto di irrigazione a goccia, consente di ottenere numerosi benefici, tra i quali:

- Potenziamento dello sviluppo della biomassa fogliare e dell'apparato radicale
- Incremento del numero dei fiori e del rapporto di allegazione
- Incremento della taglia e della consistenza dei frutti
- Miglioramento della produzione finale



## MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

COLTURE	Dosi	Numero di applicazioni	Tipo di applicazioni	Momento di applicazione
ORTICOLE Solanacee (pomodori, melanzane, peperoni) Cucurbitacee (zucca, melone, zucchini, anguria, cetriolo)	2-8 L/ha	da 2 a 8	Fogliare Irrigazione a goccia	Dal trapianto a quando il 10% dei frutti ha raggiunto la colorazione tipica della specie/varietà (BBCH 81)
COLTURE A FOGLIA (insalata, spinaci)	2-6 L/ha	da 2 a 5	Fogliare Irrigazione a goccia	Dopo il trapianto fino al raccolto, ogni 15 giorni
FRUTTI ROSSI (fragole, bacche)	2-6 L/ha	da 2 a 6	Fogliare Irrigazione a goccia	Dal trapianto all'inizio della maturazione dei frutti; maggioranza dei frutti di colore "bianco" (BBCH 81)
ORNAMENTALI (fiori)	2-6 L/ha	da 2 a 6	Fogliare Irrigazione a goccia	Nella stagione della crescita e quando appaiono i primi germogli
UVA (da vino, da tavola)	2-6 L/ha	da 2 a 4	Fogliare Irrigazione a goccia	Apertura della prima foglia (BBCH 11) fino all'inizio della maturazione, le bacche cominciano a diventare pallide (o iniziare a cambiare colore) (BBCH 81)
ARBORICOLTURA Olive, Frutta a nocciolo (pesca, nettarina, ciliegia, prugna), Frutta a semi (mela, pera)	2-6 L/ha	da 2 a 4	Fogliare Irrigazione a goccia	Prime foglie dispiegate (BBCH 11) fino all'inizio della maturazione dei frutti: i frutti diventano più chiari (BBCH 81)
AGRUMI (limoni, aranci, mandarini)	2-6 L/ha	da 2 a 4	Fogliare Irrigazione a goccia	Prime foglie visibili (BBCH 11) fino all'inizio della fruttificazione (BBCH 81)
FRUTTA A GUSCIO (noce, mandorla, nocciola)	2-6 L/ha	da 2 a 4	Fogliare Irrigazione a goccia	Sviluppo delle foglie (BBCH 11) fino all'inizio della colorazione dei frutti (BBCH 81)
CIPOLLA	2-6 L/ha	da 2 a 6	Fogliare Irrigazione a goccia	Dopo il trapianto fino al raccolto, ogni 15 giorni
AVOCADO	2-6 L/ha	da 2 a 4	Fogliare Irrigazione a goccia	Sviluppo delle foglie (BBCH 11) fino all'inizio della colorazione dei frutti (BBCH 81)
ERBA MEDICA	2-6 L/ha	da 2 a 4	Fogliare Irrigazione a goccia	Prima e dopo il taglio
PATATE	2-6 L/ha	da 2 a 8	Fogliare Irrigazione a goccia	Da BBCH 20 a BBCH 49
PRATO CAMPI SPORTIVI (football americano, calcio, rugby, tennis, hockey, polo, campi da golf)	2-6 L/ha	da 2 a 4	Fogliare Irrigazione a goccia	10 giorni dopo il taglio
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	2-6 L/ha	da 2 a 4	Fogliare Irrigazione a goccia	Da BBCH 30 a BBCH 49
CEREALI (frumento, orzo, riso)	2-4 L/ha	1	Fogliare Irrigazione a goccia	Da BBCH 11 a BBCH 40
MAIS	2-4 L/ha	1	Fogliare Irrigazione a goccia	Da V1 a V8
FAGIOLI, PISELLI	2-4 L/ha	1	Fogliare Irrigazione a goccia	Prima foglia ben visibile, delle dimensioni di un pisello (BBCH 11) alla fine della coltura: oltre il 90% delle piante in file adiacenti si toccano (BBCH 39)
LENTICCHIE, SEMI DI SOIA	2-4 L/ha	1	Fogliare Irrigazione a goccia	Dai cotiledoni completamente sviluppati (BBCH 10) fino a quando le parti vegetative raccogliabili della pianta hanno raggiunto la dimensione finale (germogli di soia per l'alimentazione) (BBCH 49)
SEMI OLEOSI (colza, girasole)	2-4 L/ha	1	Fogliare Irrigazione a goccia	Cotiledoni completamente sviluppati (BBCH 10) fino a 9 o più internodi più visibilmente allungati (BBCH 39)



## CONTENUTO DICHIARATO:

TIPOLOGIA	Biostimolante
AZOTO (N) TOTALE	3,77 % p/p
AZOTO (N) ORGANICO	2,96 % p/p
POTASSIO SOLUBILE (K <sub>2</sub> O)	3,91 % p/p
CARBONIO TOTALE, ORGANICO	19,4 %
FORMULAZIONE	Sospensione Concentrata (SC)

I costituenti del **LEAVLY+®** sono inclusi negli allegati del Reg. (UE) 2021/1165 che ne autorizza l'utilizzo nella produzione biologica, prima del suo impiego consultare il proprio Organismo di Controllo.

Tanica 10 L



**CERTIS BELCHIM B.V. – ITALIA**  
 Via Varese, 25D scala A  
 21047 Saronno (VA) - Italia  
 +39 02 96 099 83  
 info.it@certisbelchim.com  
 www.certisbelchim.it



**Certis Belchim**  
 GROWING TOGETHER