

# PHEROCON®

## TRAPPOLA PER IL MONITORAGGIO DELLA CIMICE ASIATICA (*HALYOMORPHA HALYS*)



**ALTO POTERE  
ATTRATTIVO,  
per un  
monitoraggio  
tempestivo**

- Catture costanti nel tempo grazie al **graduale e prolungato rilascio dei feromoni** di aggregazione
- Fondamentale per il corretto posizionamento degli **interventi di difesa**



**Certis Belchim**  
GROWING TOGETHER

®Pherocon è un marchio registrato SANDOZ AG - Titolare della registrazione e Prodotto originale Trécé Inc.


USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SUI SIMBOLI. SI RICHIAMA L'ATTENZIONE SULLE FRASI E SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATI IN ETICHETTA.

# SISTEMA DI MONITORAGGIO CON FEROMONE PER UNA DIAGNOSI PRECOCE DI TUTTI GLI STADI DELLA CIMICE ASIATICA




## MATERIALE OCCORRENTE

- 3 Cordini per legare trappola ed esche.
- 2 Trappole adesive.
- Esche a feromoni.



## POSIZIONAMENTO DELLE TRAPPOLE SU PIANTE ERBACEE ESTENSIVE

È consigliabile installare la trappola su un tutore, fissandola tramite i laccetti in dotazione e disponendola in posizione orizzontale. Posizionare la trappola a 1 metro dal suolo e in prossimità dell'area che si intende monitorare.



## POSIZIONAMENTO DELLE TRAPPOLE SU ALBERI E ARBUSTI

Fissare la trappola con i laccetti in dotazione a stretto contatto con i rami o il tronco, per facilitare la cattura specialmente delle forme giovanili. Le trappole devono essere ben esposte e non coperte dalla vegetazione per agevolare la diffusione del feromone. Posizionare la trappola a 1,5 metri dal suolo e in posizione orizzontale.

## KIT PER UNITÀ DI VENDITA E DURATA

Contiene 1 feromone (durata circa 12 settimane) e 2 pannelli adesivi (durata circa 6 settimane).

## MODALITÀ DI UTILIZZO

- Si consiglia di posizionare almeno 3-4 trappole per azienda (non per ettaro) a partire da metà marzo/inizio aprile.
- In ragione del comportamento della cimice asiatica è consigliabile posizionare il monitoraggio nelle aree più favorevoli all'ingresso e allo sviluppo dell'insetto, segnatamente nelle zone perimetrali della coltura in prossimità di edifici e/o siepi.
- Posizionare le trappole entro una distanza di 20-30 metri da un edificio.
- È opportuno segnalare che elevate popolazioni di *Halyomorpha Halys* possono aumentare i danni alle piante in prossimità delle trappole.
- Sostituire i feromoni e i pannelli adesivi come da indicazioni (vedi kit per unità di vendita e durata).

## AVVERTENZE

Ai fini del successo di monitoraggio è fondamentale il posizionamento della trappola. È necessario riposizionare le trappole se le catture risultano essere scarse o nulle.



**CERTIS BELCHIM B.V. – ITALIA**

Via Varese, 25D scala A  
21047 Saronno (VA) - Italia  
+39 02 96 099 83  
info.it@certisbelchim.com  
[www.certisbelchim.it](http://www.certisbelchim.it)



**Certis Belchim**  
GROWING TOGETHER

®Pherocon è un marchio registrato SANDOZ AG - Titolare della registrazione e Prodotto originale Trécé Inc.

USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SUI SIMBOLI. SI RICHIAMA L'ATTENZIONE SULLE FRASI E SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATI IN ETICHETTA.